

# Vacunación COVID-19 y Otras vacunas en el Personal de Salud

6 de abril de 2022


**Argentina** **unida**



Ministerio de Salud  
Argentina

# DATOS del MONITOR PÚBLICO DE VACUNACIÓN

Vacunas  
ingresadas al  
país a la  
fecha



>100 millones de dosis



# **Vacunas contra la COVID-19 autorizadas para uso de emergencia en Argentina son:**

1. Vacuna Comirnaty de Pfizer-Biontech (ARNm)
2. Vacuna Sputnik V: Vector viral no replicativo (Ad26-Ad5)
3. Vacuna ChAdOx1-S de AstraZeneca Vector viral no replicativo (chimpanzee)
4. Vacuna ChAdOx1-S de CoviShield Vector viral no replicativo (chimpanzee)
5. Vacuna Sinopharm (inactivada)
6. Vacuna Moderna (ARNm)
7. Vacuna Cansino (Ad5-nCoV)



## *Propósitos*

Disminuir la morbilidad-mortalidad y el impacto socio-económico ocasionados por la COVID-19 en Argentina.

Contribuir a la estrategia de contención de la pandemia de COVID-19 incidiendo en la transmisión viral.

## *Objetivo*

Vacunar al 100% de la población objetivo en forma escalonada y progresiva, de acuerdo con la disponibilidad gradual y creciente del recurso y a la priorización de riesgo.



| Población objetivo                                                                                                                                |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| RIESGO                                                                                                                                            |                                  |
| De enfermedad grave                                                                                                                               | Exposición y función estratégica |
| Adultos mayores de 60 años                                                                                                                        | Personal de salud                |
| Personas de 3 a 59 años con factores de riesgo                                                                                                    | Personal estratégico             |
| VULNERABILIDAD                                                                                                                                    |                                  |
| Barrios populares/Personas en situación de calle/Pueblos originarios/Personas privadas de libertad/Migrantes/Docentes universitarios/Otros grupos |                                  |
| PERSONAS DE 3 AÑOS Y MAYORES SIN FACTORES DE RIESGO                                                                                               |                                  |

EN EVALUACIÓN la VACUNACIÓN DE MENORES SEGÚN APROBACIÓN DE VACUNAS



# Esquemas de intercambiabilidad para el esquema inicial

| Primeras dosis         | Segundas dosis                                                                          | Intervalo mínimo       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Sputnik V componente I | AstraZeneca o CanSino                                                                   | 8 semanas              |
|                        | Moderna o Pfizer                                                                        |                        |
| AstraZeneca            | CanSino, Sputnik V Componente I, Sputnik V Componente II, Moderna o Pfizer              |                        |
| Pfizer                 | Moderna                                                                                 | 28 días<br>(4 semanas) |
| Moderna                | Pfizer                                                                                  |                        |
| Sinopharm              | Sputnik V Componente I, Sputnik V Componente II, AstraZeneca, Cansino, Pfizer o Moderna |                        |



# Intervalo entre dosis recomendados según plataforma vacunal

| Plataforma vacunal de la primera dosis recibida (esquema inicial) | Intervalo mínimo recomendado entre dosis |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Virus inactivados (Sinopharm)                                     | 4 semanas                                |
| ARNm (Moderna y Pfizer)                                           |                                          |
| Vector viral no replicativo (AstraZeneca/COVISHIELD y Sputnik V)  | 8 semanas                                |

| DOSIS DE REFUERZO                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 120 DÍAS                                                                                                                                                                        |
| POST COVID, SE RECOMIENDA diferirla al menos 90 días luego de cumplidos los criterios de alta y habiendo transcurrido al menos 4 meses desde la aplicación del esquema inicial. |



# Vacunas recomendadas según población objetivo

| Población objetivo              | Vacunas recomendadas es-<br>quema inicial                                            | Vacunas recomendadas<br>refuerzo                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Niños y niñas de 3<br>a 11 años | Sinopharm                                                                            | A definir                                                                 |
| Adolescentes                    | Moderna o Pfizer                                                                     | Moderna o Pfizer                                                          |
| Embarazadas                     | Pfizer, Moderna o Sinopharm                                                          | Pfizer, Moderna                                                           |
| Resto de la<br>población        | Sputnik V CI, Sputnik V CII,<br>AstraZeneca, Cansino, Pfizer,<br>Moderna o Sinopharm | Sputnik V CI, Sputnik V CII,<br>AstraZeneca, Cansino, Pfizer o<br>Moderna |



## Cobertura dosis 1

89,3%

Población total

93,8%

3 años y más

97,1%

18 años y más

96,3%

50 años y más

## Cobertura dosis 2

80,2%

Población total

84,3%

3 años y más

90%

18 años y más

93,1%

50 años y más

## Cobertura Refuerzo

58,1%

Población 18 a 59 (sin  
personal de salud)


61,7%

Personal de  
salud 18 a 59

76,8%

Población 60  
años y más


# Tasas de incidencia c/100.000 hab según estado de vacunación. SE 08 - SE 12 / 2022.



Referencias:


- Sin dosis: casos sin vacuna o con una sola dosis aplicada menos de 21 días antes de la fecha de contagio (fecha gráfico)
- \*Esquema incompleto: casos con una sola dosis de vacuna o con segunda dosis aplicada en un tiempo mayor a 120 días de la fecha de contagio (fecha gráfico).
- \*\*Esquema completo: casos con segunda dosis aplicada en un tiempo menor a 120 días de la fecha de contagio (fecha gráfico) o casos con 3 o 4 dosis de vacuna.

# Tasas de mortalidad c/100.000 hab según estado de vacunación. SE 08 - SE 12/ 2022.



Referencias:  
Sin dosis: fallecidos sin vacuna o con una sola dosis aplicada menos de 21 días antes de la fecha de contagio (fecha gráfico)  
\*Esquema incompleto: fallecidos con una sola dosis de vacuna o con segunda dosis aplicada en un tiempo mayor a 120 días de la fecha de contagio (fecha gráfico).  
\*\*Esquema completo: fallecidos con segunda dosis aplicada en un tiempo menor a 120 días de la fecha de contagio (fecha gráfico) o fallecidos con 3 dosis de vacuna.

# Letalidad (%) según esquema y rango etario. SE 01/2021 - SE 12/ 2022.



# Vacunación del Personal de Salud

| Vacuna                        | Indicación y esquema                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hepatitis B                   | Tres dosis (0,1 y 6 meses) IM. Dosar Anti HBsAg 1-2 meses luego de la última dosis.                                                                                            |
| Influenza                     | Una dosis anual en época pre-epidémica. IM                                                                                                                                     |
| Sarampión Rubeola Parotiditis | Dos dosis (0, 1 mes) en ausencia de evidencia de inmunidad. SC                                                                                                                 |
| Varicela                      | Dos dosis (0, 1 mes) en ausencia de evidencia de inmunidad. SC                                                                                                                 |
| Tétanos Difteria Pertussis    | Una dosis única de Triple acelular dos años después de la última dosis de dT<br>Una dosis de doble adulto cada 10 años.                                                        |
| Meningococo                   | Una dosis a microbiólogos y cualquier otro personal con riesgo de contacto con <i>N. meningitidis</i>                                                                          |
| Hepatitis A                   | Dos dosis (0 y 6 meses) áreas de neonatología y pediatría, personal de laboratorio en contacto con virus, maestranza y manejo de alimentos. Solo en vcaso de HAV IgG negativa. |



## Programa de inmunización del personal de la salud

Toda institución de salud debería tener un programa de inmunización de su personal. Incluir las siguientes acciones:

1. Evaluación para todo el personal de los antecedentes clínicos y serológicos (en los casos en los que estuviera indicada) de las enfermedades prevenibles por vacunas (sarampión, rubeola, parotiditis, varicela, hepatitis B, hepatitis A, etc.)
2. Registro del estado de inmunización previo.
3. Provisión y administración de las vacunas recomendadas para el personal.
4. Control de la respuesta inmune para las vacunas en las que estuviera indicado (por ej.: hepatitis B).
5. Detección y manejo de los posibles efectos supuestamente atribuidos a vacunas (ESAVI)



# *Se viene la próxima campaña de seguimiento SRP-Polio*

**Niñ@s entre 13 meses y 4 años**

**A partir de Octubre 2022**



Ministerio de Salud  
Argentina

**Argentina** **unida**



Ministerio de Salud  
**Argentina**